

Le Larry de Bourdon

Le larris : un écosystème particulier mais fragile

Le larris est occupé principalement par des pelouses rases issues des pratiques pastorales du siècle dernier, surplombant des éboulis crayeux qui résultent de l'exploitation ancienne de la craie. Le sol du larris de Bourdon est essentiellement constitué de craie assez riche en silice, le substrat du sol est donc poreux. Combiné à la forte pente et à une exposition sud, il en résulte un sol qui a une très faible capacité de rétention d'eau. Une sorte de microclimat qui ne permet qu'à une végétation adaptée de se développer, donnant ainsi une originalité particulière aux espèces retrouvées ici.

Véronique germandrée
Veronica teucrium

On trouve ici des espèces de plantes typiques des sols crayeux secs à la végétation rase, comme le **Sisymbre couché** ① (*Sisymbrium supinum*), protégé à l'échelle européenne, l'exceptionnelle **Fausse Roquette de France** (*Erucastrum gallicum*), la très rare **Epervière fachtée** (*Hieracium maculatum*), le **Bunium Noix de terre** ② (*Bunium bulbocastanum*) ou encore la **Véronique germandrée**.

Une faune, elle aussi typique des milieux ouverts et secs se retrouve, à l'image des papillons **Hespérie du chiendent** (*Thymelicus acteon*), **Fluoré** (*Colias alfariensis*), l'**Azuré bleu-céleste** (*Polyommatus bellargus*), du **Criquet noir-ébène** ou encore le **Criquet de la Palène** (*Stenobothrus lineatus*). ③


Fausse roquette de France
Erucastrum gallicum



Fluoré
Colias sareptensis

Le Cimetière militaire allemand de Bourdon offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Somme qu'il domine depuis le plateau. En contrebas, se trouve le Larry de Bourdon. Celui-ci, comme son voisin d'Hangest-sur-Somme situé sur la rive gauche, s'est formé il y a plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. À cette époque, le fleuve Somme au débit torrentiel a creusé les flancs et a ainsi créé des coteaux particulièrement pentus (appelés larris en Picard).

Le paysage est très contrasté entre les plateaux au sommet des versants de la vallée, quasi exclusivement voués à la grande culture (céréales, betteraves, pomme de terre, cultures fourragères), et le fond de vallée, plus humide et difficilement cultivable, boisé ou planté de peupliers.



Propriété de la commune de Bourdon et du département de la Somme, le larris s'allonge sur environ 1 km de long et s'étend sur près de 5 ha. Il est constitué essentiellement de milieux ouverts avec un large front de taille qui s'étend sur l'essentiel de sa longueur, ayant servi jusque dans les années 80 à l'extraction de la craie. La gestion de cet espace naturel a été confiée au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France.

Azuré bleu-céleste
Polyommatus bellargus

Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes

Les actions du Conservatoire sur ce site sont possibles grâce au soutien de ses partenaires :



Bourdon < Somme < Hauts-de-France

Merci de respecter les milieux naturels, restez sur le sentier dédié à la promenade. Veuillez jeter vos déchets dans les poubelles de recyclage. La circulation d'engins motorisés sur le site est interdite.

Pour tout renseignement sur le site, merci de contacter la commune ou le gestionnaire :
Conservatoire d'espaces naturels région Hauts-de-France • Tél. 03 22 89 63 96 • www.cen-hautsdefrance.org

Entdecken den Bourdon Larry !



Unter dem deutscher Militärischen Friedhof befindet sich der Larris de Bourdon (Ausdruck speziell aus der Picardie für nicht bewaldete Kalkhügel), welcher durch die Kreideerosion des Flussbettes der Somme vor mehreren hundert bis Millionen Jahren entstanden ist.

Der Larris erstreckt sich über ca. 1 km Länge und hat eine Fläche von ca. 5 ha. Die Bewirtschaftung dieses Naturraums wurde dem Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France zur Erhaltung seines besonderen Ökosystems übertragen. Die, sehr kurzen, Grasflächen und der Kreideschutt bieten eine geeignete Fauna und Flora wie die Niederliegende Rauke (*Sisymbrium supinum*) oder der Geflecktes Habichtskraut (*Hieracium maculatum*).

Auch die Fauna ist typisch für offene und trockene Lebensräume mit mehreren Schmetterlingen: Mattscheckige Braun-Dickkopffalter (*Thymelicus acteon*), Hufeisenkleegelbling (*Colias alfariensis*) oder Heuschrecken: Buntbäuchiger Grashüpfer (*Omocestus rufipes*) oder Heidegrashüpfer (*Stenobothrus lineatus*).

Die weidenden Schafe sind wichtige Verbündete bei der Erhaltung des Gebiets : ein Dutzend von Boulonnais-Schafe, eine rustikale Rasse aus Nordfrankreich, weiden und tragen somit zur Kurzhaltung der Grasflächen bei und begrenzen die Entwicklung von Sträuchern, die das Gebiet besiedeln.



Hespérie du chiendent
Thymelicus acteon

Le pâturage ovin : allié de l'entretien

L'un des enjeux majeurs du site est la préservation et la restauration des pelouses rases calcicoles, qui abritent la majorité des espèces protégées, notamment papillons et criquets. Il a été choisi pour cela de remettre en œuvre le pâturage par des moutons, comme cela était pratiqué au siècle dernier.

Depuis 2017, ce sont une dizaine de moutons Boulonnais qui ont réinvesti le site. Cette race ovine rustique du Nord de la France, après avoir bien failli disparaître, reprend aujourd'hui le dessus. Ses qualités (grand gabarit solide, bonne aptitude à la marche, faibles exigences alimentaires, facilité d'agnelage*) en font une race particulièrement adaptée, notamment pour l'entretien par pâturage des milieux naturels secs.

Ils contribuent ainsi au maintien de la pelouse rase et limitent le développement de l'ourlet à brachypode, graminée courante qui témoigne d'un début d'embroussaillage des coteaux calcaires, et des arbustes qui colonisent le site.

* Mise bas chez la brebis.

